

Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 4 du 14 avril 1986

COLZA

CHARANCON DE LA TIGE : Un peu tard pour intervenir

MELIGETHE : Le vol a démarré

TOURNESOL

DESHERBAGE : Bien rincer le pulvérisateur après utilisation de Racer

MAIS : Le nouveau dépliant SPV - AGPM est paru !


Vous y trouverez tout ce qui concerne la protection phytosanitaire du maïs / traitements insecticides du sol ; désherbage - produits anti-pyrale...) - CONSERVEZ LE !

COLZA

CHARANCON DE LA TIGE : UN PEU TARD POUR INTERVENIR


Dans la majorité des situations, l'activité des charançons est restée faible en raison du temps froid.

Dans quelques parcelles situées près d'anciens champs de colza, on a pu toutefois observer des piqûres de ponte depuis le 7 - 8 avril. **Il est donc un peu tard pour intervenir** (le traitement doit détruire les adultes avant la ponte).



Hauteur de tige : 20 cm = fin de la période sensible au charançon

MELIGETHES : LE VOL A DEMARRE



Stade D 1 : boutons accolés encore cachés par les feuilles

Le colza aborde le stade de sensibilité vis-à-vis des méligèthes : stade D1 (voir ci-contre).

Les premières captures ont été enregistrées dans le Bas-Rhin : HOFFEN-WIWER-SHEIM : 8.04 ; GAMBSHEIM : 09.04.

Surveillez vos cultures et vos cuvettes de piégeage dès le premier réchauffement. Les infestations précoces de méligèthes (quand les boutons floraux sont petits) sont les plus préjudiciables.

Imprimerie de la Station de Strasbourg

Directeur-Gérant D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP N° : 1848 AD.

Abonnement annuel : 110,- F.
XXXX 130 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative

67084 STRASBOURG CEDEX

Alsace : (88) 37.32.18. - 69.65.89.

Haut-Rhin (89) 41.11.68.



P194

Produits utilisables (g. matière active/ha) - (1. produit commercial/ha)

• alphaméthrine (10) : Fastac (0,2 l)	• fluvalinate (48) : Klartan (0,2 l)
• cyfluthrine (15) : Baythroid (0,3 l)	• lindane (200) : Nbx spécialités
• cyperméthrine (25) : Nbx spécialités	• méthidathion (250) : Ultracide 20 L (1,31)
• deltaméthrine (7,5) : Décis (0,3 l)	• parathion éthyl (200) : Nbx spécialités
• endosulfan (250) : Nbx spécialités	• parathion méthyl (250) : Nbx spécialités
• fenvalérate (50) : Sumicidin 10 (0,5 l)	• phosalone (1 000) : Azofène flo) Zolone flo) (2 l)

AIL

DESHERBAGE : Destruction des dicotylédones

Contre les dicotylédones, on peut utiliser **à partir du stade 4 feuilles** de la culture (jusqu'à 7 jours avant récolte) : ioxynil octanoate :

- BENTROL	: 2,5 l/ha,
- IOTRILEX 240	: 2,5 l/ha,
- TOTRIL	: 2,4 l/ha.

ASPERGE


MOUCHE : Traitez au bon stade

Biologie - dégâts

La mouche de l'asperge dépose ses oeufs dans les turions dès leur sortie de terre. Les asticots blancs issus de ces oeufs, creusent des galeries descendantes et provoquent le dessèchement des tiges.

Des dégâts sont à craindre dans les aspergeraies en voie d'établissement et dans les parcelles où la période de cueillette est courte (aspergeraies en 4^e et 5^e année).

Lutte : Trois traitements successifs doivent être réalisés à des stades précis de la culture (voir ci-contre).



Stades végétatifs de l'asperge pour la lutte contre la mouche

(D'après J. HENNEQUIN)

Produits utilisables (g. de matière active/hl)

• diazinon (30)	: nombreuses spécialités
• diméthoate (50)	: nombreuses spécialités
• formothion (50,7)	: Anthio Fort (0,15 l/hl)

SEUIL D'INTERVENTION : 1 MELIGETHE PAR BOUTON FLORAL

Les produits utilisables

MATIERES ACTIVES (M.A.)	PRODUITS COMMERCIAUX (P.C.)	DOSE en g. DE M.A./HA	DOSE en l. DE P.C./HA
alphaméthrine	FASTAC	10	0,2
bromophos	NEXION 25 - NEXION 40	500	2 - 1,4
cyfluthrine	BAYTHROID	10	0,2
cyperméthrine	Nombreuses spécialités	20	*
deltaméthrine	DECIS	5	0,2
dialiphos	TORAK	540	1,25
endosulfan	Nombreuses spécialités	250	*
fenvalérate	SUMICIDIN 10	40	0,4
fenvalérate	MAVRIK	48	0,2
lindane	Nombreuses spécialités	200	*
méthidathion	ULTRACIDE 20 L	250	1,3
parathion éthyl ou méthyl	Nombreuses spécialités	200	*
phosalone	AZOFENE FLO ZOLONE FLO	1 000	2

* : concentration en M.A. variable selon les produits.

TOURNESOL

DESHERBAGE : BIEN RINCER LE PULVERISATEUR APRES UTILISATION DE RACER

Les produits à base de fluoro-chloridone (RACER, WINNER) ont souvent occasionné des phytotoxicités ayant pour cause un mauvais rinçage du pulvérisateur.

Pour éviter cet incident, un rinçage soigneux du pulvérisateur immédiatement après emploi de ces produits et avant séchage de la cuve est fortement conseillé.

Dans le cas où l'on traiterait par la suite, des cultures sensibles au fluoro-chloridone (colza, vigne...), seul le SOLVANT 73 (isophorone) permet un bon nettoyage du matériel de pulvérisation.

Utilisez une solution à 2 % de SOLVANT 73, maintenir une forte agitation de la cuve et vider par la rampe.